

Flugverkehr im Lebensraum des Adlers

Für Steinadler sind Störungen am Horst, vor allem in der Brut- und Nestlingszeit, besonders problematisch

Die Folgen:

- Bruterfolg bleibt aus
- Verlassen des Nestes beim Brüten und damit Verlust der Brut
- Vernachlässigung der Nestlinge, zu wenig Futtereintrag

Sensibelste Zeit:

Brutzeit: **ca. ab Mitte April bis Mai**

Nestlingszeit: **ca. Anfang Mai bis Ende Juni**

Verhaltensempfehlungen:

In den sensiblen Phasen optimalerweise **1 Kilometer Abstand** zur Schutzzone halten bzw. gekennzeichnete Schutzzone ganz meiden

Basisfakten:

Steinadler beanspruchen, markieren und verteidigen ein Revier von 30-100 km² Fläche. In diesem Revier richtet das Adlerpaar meist mehrere Horste ein. Für die Jungtiere ist das 1. Lebensjahr das gefährlichste: ca. 75% der Jungadler sterben vor Erreichen der Geschlechtsreife. Ab der sechsten Lebenswoche vollführen sie ihre ersten Flugübungen. Mit acht Wochen beginnen sie in unmittelbarer Nähe des Horstes herum zu klettern und die Eltern locken die Jungen mit Futter, damit sie aus dem Horst ausfliegen.

Flug

*Gleitfluggeschwindigkeit.: 130-190 km/h

*Stoßflug: bis 320 km/h

Fluchtdistanzen (ab welchem Abstand flüchtet das Tier)

*sitzender Adler: 200 m

*fliegender Adler: deutlich geringer